

【胆道癌】

レジメン名称: イミフィンジ+ゲムシタピン+シスプラチン  
 催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注	25mg/m <sup>2</sup>		day1.8	—	炎症性
8	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>		day1.8	—	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	
2	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100ml 体重30kg以下の場合はイミフィンジ20mg/kgに変更 * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1500mg/body 100ml	投与順2	
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3	
4	点滴静注	生理食塩液1000ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン	1000ml	投与順4	投与順1
5	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 4A 100ml	投与順5	投与順2
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順3
7	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	25mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順7	投与順4
8	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/m <sup>2</sup> 100ml	投与順8	投与順5
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順9	投与順6