

【乳癌】

レジメン名称: dose dense EC

インターバル日数: 14日間 基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	中心静脈注射	エビルピシン注射用	90mg/m ²	-	day 1	-	壊死性	900mg/m ²
5	中心静脈注射	注射用エンドキサン	600mg/m ²	-	day 1	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	エビルピシン注射用 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 15分 投与経路:CVルートメイン側管	90mg/m ² 50ml	投与順4
5	中心静脈注射	注射用エンドキサン 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン側管	600mg/m ² 100ml	投与順5
6	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 15分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1もしくはday2
1	皮下注射	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポット	3.6mg	day1もしくはday2