

【肺癌】

レジメン名称:オニバイド+5-FU/LV

インターバル日数:14日

基準日:day 1

催吐性リスク:中程度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	オニバイド点滴静注	70mg/m ²	-	day1	フィルタ-禁止	炎症性
6	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	-	day1	-	-
7	中心静脈注射	5-FU注	2400mg/m ²	-	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1V 1P	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	オニバイド点滴静注 大塚糖液 5% 500ml 中心静脈注射: * 点滴時間90分 投与経路:CVルートメイン	70mg/m ² 500ml	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順5
6	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 投与経路:CVルートメイン	200mg/m ² 250ml	投与順6
7	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 中心静脈注射: * 点滴時間46時間 投与経路:CVルートメイン	2400mg/m ² 適宜	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg