

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : R2(2~5サイクル)

催吐性リスク : 軽度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	-	day1	-	非炎症性	-
1	内服	レブラミドカプセル5mg	20mg	-	day1~21	-	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	ポラミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 50ml	投与順2
3	点滴静注	ソルメドロール静注125mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	125mg 100ml	投与順3
4	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:末梢ルートメイン側管	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1~21
1	内服	レブラミドカプセル5mg	20mg	day1~21

★ 6~12サイクルはレブラミドのみ