

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : ビキセオス寛解導入(2サイクル)

インターバル日数 :

35 日

催吐性リスク : 中等度

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	中心静脈注射	ビキセオス配合静注	100ユニット/m ²	-	day1、3	フィルター禁止	壊死性	タウルピシン25mg/kg

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day3
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート	100ml	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管	1P	投与順2	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート側管	50ml	投与順3	投与順3
4	中心静脈注射	ビキセオス配合静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 500ml 100ユニット/Vは注射用水19mlで溶解(5ユニット/ml) 点滴静注 * 点滴時間90分 投与経路: CVメインルート側管	100ユニット/m ² 必要量 500ml	投与順4	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート側管	50ml	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	アプレピタントカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg