

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : ビキセオス地固め

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 :

35 日

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 | 総投与量 |
|----|--------|-----------|-----------------------|-----|--------|---------|-------|---------------|
| 4 | 中心静脈注射 | ビキセオス配合静注 | 65ユニット/m ² | - | day1、3 | フィルター禁止 | 壊死性 | タウルピシン25mg/kg |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day3 |
|----|--------|--|---------------------------------------|------|------|
| 1 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート | 100ml | 投与順1 | 投与順1 |
| 2 | 中心静脈注射 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: CVメインルート側管 | 1P | 投与順2 | 投与順2 |
| 3 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート側管 | 50ml | 投与順3 | 投与順3 |
| 4 | 中心静脈注射 | ビキセオス配合静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 500ml 100ユニット/Vは注射用水19mlで溶解(5ユニット/ml) 点滴静注 * 点滴時間90分 投与経路: CVメインルート側管 | 65ユニット/m ² 必要量 500ml | 投与順4 | 投与順4 |
| 5 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVメインルート側管 | 50ml | 投与順5 | 投与順5 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 |
|----|----|-------------|------------|-------|------|------|
| 1 | 内服 | アプレピタントカプセル | 125mg、80mg | 125mg | 80mg | 80mg |