

【末梢性T細胞リンパ腫、皮膚T細胞性リンパ腫】

レジメン名称 : レミトロ

催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 :

21 日

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	点滴静注	レミトロ点滴静注用	9 μ g/kg	-	day1～5	フィルター禁止	非炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	4A 1A 100ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路: 末梢ルートメイン側管	250ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	レミトロ点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 50ml 300 μ g/Vを注射用水2.1mlで溶解(150 μ g/ml) 3 μ g/ml以上の濃度になるように調製 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路: 末梢ルートメイン側管	9 μ g/kg 必要量 50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路: 末梢ルートメイン側管	250ml	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	アセトアミノフェン錠500mg	500mg	500mg	500mg	500mg	500mg	500mg

★ アセトアミノフェンはレミトロ投与前30～60分に投与