

【泌尿器 尿路上皮癌】

レジメン名称:パドセブ+キイトルーダ

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	パドセブ点滴静注用	1.25mg/kg	125mg	day1、8、	-	炎症性
5	点滴静注	キイトルーダ点滴静注	200mg/body	-	day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	パドセブ点滴静注用 注射用水20ml 生理食塩液 50ml 30mg/Vあたり注射用水3.3mlで溶解(10mg/ml) 0.3~4.0mg/mlになるように調製 * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1.25mg/kg 50ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間 初回30分、2回目以降15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4	
5	点滴静注	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200mg 100ml	投与順5	
6	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順4