

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ポートラーザ維持

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|------------|------------|-----|--------|-----|-------|
| 4 | 点滴静注 | ポートラーザ点滴静注 | 800mg/body | — | day1、8 | — | 非炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day8 |
|----|------|--|----------------------|------|------|
| 1 | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 100ml | 投与順1 | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 4A 100ml | 投与順2 | 投与順2 |
| 3 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順3 | 投与順3 |
| 4 | 点滴静注 | ポートラーザ点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 800mg/body 計250ml | 投与順4 | 投与順4 |
| 5 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順5 | 投与順5 |