

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+パクリタキセル

インターバル日数: 42日

基準日: day 1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	オブジーボ点滴静注	360mg/body		day1、day22	フィルター付き	非炎症性
5	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg		day1	フィルター付き	非炎症性
9	点滴静注	パクリタキセル注射用	200mg/m ²		day1、day22	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
10	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC6	900mg	day1、day22		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day22
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	オブジーボ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	360mg/body 100ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4	
5	点滴静注	ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1mg/kg 25ml	投与順5	
6	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順4
7	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 12A 1A 1A	投与順7	投与順5
8	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順8	投与順6
9	点滴静注	パクリタキセル注射用 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	200mg/m ² 500ml	投与順9	投与順7
10	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC6 250ml	投与順10	投与順8
11	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順11	投与順9

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1、22	day2、23	day3、24
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg