【非小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+TS1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC5	750mg	day1	_	炎症性

インターバル日数:21 日 基準日:day 1

Rр	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml	100ml	投与順1
		ルートキープ用		
		点滴静注:		
		*点滴時間30分		
		投与経路:末梢ルートメイン		
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml	1V	投与順2
		グラニセトロン点滴静注3mg/100ml	1P	
		デキサート注射液1.65mg/0.5ml	3A	
		点滴静注:		
		*点滴時間30分		
		投与経路:末梢ルートメイン側管		
3	点滴静注	生理食塩液 50ml	50ml	投与順3
		点滴静注:		
		*点滴時間5分		
		投与経路:末梢ルートメイン側管		
4	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC5	投与順4
		生理食塩液 250ml	250ml	
		点滴静注:		
		*点滴時間60分		
	_	投与経路:末梢ルートメイン側管		
5	点滴静注	生理食塩液 50ml	50ml	投与順5
		点滴静注:		
		* 点滴時間5分		
		投与経路:末梢ルートメイン側管		

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位		day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/ m ²	day1 ∼ 14		