

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+アブラキサン

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²		day1.8.15	フィルター禁止	壊死性
7	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1			投与順1	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 3A 1P	投与順2				
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml				投与順2	投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3			投与順3	投与順3
5	点滴静注	アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m ² 50ml	投与順4			投与順4	投与順4
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5			投与順5	投与順5
7	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC6 250ml	投与順6				
8	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7				

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day8	day15
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg		