

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+パクリタキセル+アバスチン+テセントリク
 催吐性リスク:中等度

インターバル日数:21日

基準日:day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	テセントリク点滴静注	1200mg/body	-	day1	フィルター付き	非炎症性
5	点滴静注	アバスチン点滴用	15mg/kg	-	day1		非炎症性
9	点滴静注	パクリタキセル注射用	200mg/m ²	-	day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
10	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC6	900mg	day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順2
3	点滴静注	テセントリク点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間 初回60分、2回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1200mg/body 250ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4
5	点滴静注	アバスチン点滴用 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間 初回90分 2回目60分、3回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	15mg/kg 100ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6
7	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 12A 1A 1A	投与順7
8	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順8
9	点滴静注	パクリタキセル注射用 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	200mg/m ² 500ml	投与順9
10	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC6 250ml	投与順10
11	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順11

Rp	手技	薬剤名称	標準値	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg