

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ペメトレキセド+カルボプラチン  
 催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21 日 基準日: day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m <sup>2</sup>		day1	-	非炎症性
5	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC5~6	900mg	day1	-	炎症性

(AUC5で登録、必要時AUC6に変更してください)

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 3A	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3
4	点滴静注	ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間10分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500mg/m <sup>2</sup> 計100ml	投与順4
5	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml AUCは5~6 登録はAUC5 必要時変更してください。 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC5~6 250ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg	4mg	4mg
2	内服	パンビタン末	1g(葉酸0.5mg)	初回投与の7日前から連日投与	
3	筋肉注射	メチコバルル注射液500μg	1000μg(2A)	初回投与の7日前に投与、その後9週ごと(3コースごと)に1回投与	