

【泌尿器 尿路上皮癌】

レジメン名称 ゲムシタビン+カルボプラチン

インターバル日数:21日

基準日:day 1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	ゲムシタビン注射用	1000mg/m ²		day1、8		炎症性
6	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC4.5		day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 3A	投与順2	
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	
4	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順2
5	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用 大塚生食注 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/m ² 100ml	投与順4	投与順3
6	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC4.5 250ml	投与順5	
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day2	day3
1	内服	デカドロン	4mg	4mg	4mg