

【悪性黒色腫】

レジメン名称 : DAVFeron

インターバル日数 : 28 日

嘔吐性リスク : 高度

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 | 標準値 |
|----|------|---------|----------------------|-----|--------|-----|-------|--------------------------|
| 4 | 点滴静注 | ダカルバジン注 | 140mg/m ² | | day1-5 | | 炎症性 | 80~140mg/m ² |
| 5 | 点滴静注 | ニドラン注 | 80mg/m ² | | day1 | | 壊死性 | 50~80mg/m ² |
| 6 | 点滴静注 | オンコビン注 | 0.8mg/m ² | 2mg | day1 | | 壊死性 | 0.5~0.8mg/m ² |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン | 500ml | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン側管 | 1V 1V 6A 100ml | 投与順2 | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順3 | | | | |
| 4 | 点滴静注 | ダカルバジン注 生理食塩液 50ml 遮光 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管 | 140mg/m ² 50ml | 投与順4 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 |
| 5 | 点滴静注 | ニドラン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管 | 80mg/m ² 50ml | 投与順5 | | | | |
| 6 | 点滴静注 | オンコビン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管 | 0.8mg/m ² 50ml | 投与順6 | | | | |
| 7 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順7 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 |
|----|------|------------|--------|---------|------|------|------|
| 1 | 内服 | デカドロン | 8mg | | 8mg | 8mg | 8mg |
| 2 | 皮内注射 | フェロン300万単位 | 300万単位 | day1-10 | | | |