

【悪性黒色腫】

レジメン名称 : ダカルバジン
 催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 28日
 基準日 : day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
5	点滴静注	ダカルバジン注用	200mg/body		day1~5		炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液100ml ルートキープ用 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液1.65mg 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 6A	投与順2				
3	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液1.65mg 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1P 6A		投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3				
5	点滴静注	ダカルバジン注用 5%糖液100ml 遮光 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200mg/body 100ml	投与順4	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4