

【小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+エトポシド 催吐性リスク:中等度

インターバル日数:21日 基準日:day 1
(通常21~28日)

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|-------------|---------------------|-------|----------|--------|-------|
| 6 | 点滴静注 | カルボプラチン点滴静注 | AUC5 | 750mg | day1 | | 炎症性 |
| 5 | 点滴静注 | エトポシド点滴静注液 | 80mg/m ² | | day1.2.3 | PVC7リ- | 炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 |
|----|------|---|------------------------------|------|------|------|
| 1 | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン | 100ml | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 |
| 2 | 点滴静注 | アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 1V 1P 3A | 投与順2 | | |
| 3 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順3 | | |
| 4 | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 2A 100ml | | 投与順2 | 投与順2 |
| 5 | 点滴静注 | エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 80mg/m ² 500ml | 投与順4 | 投与順3 | 投与順3 |
| 6 | 点滴静注 | カルボプラチン点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | AUC5 250ml | 投与順5 | - | - |
| 7 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管 | 50ml | 投与順6 | 投与順4 | 投与順4 |