

【小細胞肺癌】

レジメン名称:シスプラチン+エトポシド+イミフィンジ 催吐性リスク:高度

インターバル日数:21日

基準日:day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注	75~80mg/m ²		day1	-	炎症性
9	点滴静注	エトポシド点滴静注液	80~100mg/m ²		day1.2.3	PVCフリー	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	
2	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順2			
3	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100ml 体重30kg以下の場合はイミフィンジ20mg/kgに変更 * 点滴時間 60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1500mg/body 100ml	投与順3			
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4			
5	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順5			
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6			
7	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順2	投与順2	投与順1 メイン
8	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml	投与順7			
9	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 80mg~100mg/m ² 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m ² 500ml	投与順8	投与順3	投与順3	
10	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順9			
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 75~80mg/m ² 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	80mg/m ² 計500ml	投与順10			
12	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 500ml	投与順11			
13	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順12	投与順4	投与順4	
14	点滴静注	生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用)	20ml	投与順13	投与順5	投与順5	