

【泌尿器 精巣癌】

レジメン名称: BEP 催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 21日 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
9	点滴静注	シスプラチン点滴静注	20mg/m <sup>2</sup>		day1.2.3.4.5		炎症性	
7	点滴静注	エトポシド点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>		day1.2.3.4.5	PVCフリー	炎症性	
6	点滴静注	ブレオ注射用	30mg/body	30mg/body	day2.9.16		炎症性	360mg

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day9	day16
1	点滴静注	生理食塩液 1000ml 点滴静注: ※点滴時間6時間 投与経路:末梢ルートメイン	1000ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1		
2	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml						投与順1	投与順1
3	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2						
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3						
5	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
6	点滴静注	ブレオ注射用 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	30mg/body 50ml		投与順3				投与順3	投与順3
7	点滴静注	エトポシド点滴静注液 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: ※点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順4	投与順4	投与順3	投与順3	投与順3		
8	点滴静注	マンニトール注20% 300ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順5	投与順5	投与順4	投与順4	投与順4		
9	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	20mg/m <sup>2</sup> 500ml	投与順6	投与順6	投与順5	投与順5	投与順5		
10	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7	投与順7	投与順6	投与順6	投与順6	投与順4	投与順4