

【大腸癌】

レジメン名称:FOLFIRI+アビタックス1週間毎【初回】

インターバル日数:14日

基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5 6	中心静脈注射	アビタックス注射用	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	-	day1 day8	-	非炎症性
8	中心静脈注射	イリノテカン点滴静注	150mg/m ²	-	day1	-	炎症性
7	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	-	day1	-	-
9	中心静脈注射	5-FU注	400mg/m ²	-	day1	-	炎症性
10	中心静脈注射	5-FU注	2400mg/m ²	-	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボララミン注5mg アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1A 1V 1P	投与順2	
3	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボララミン注5mg 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	4A 1A 100ml		投与順2 側管
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順3	
5	中心静脈注射	アビタックス注射用 生理食塩液 500ml 中心静脈注射: * 点滴時間 2時間 投与経路:CVルートメイン	400mg/m ² 500ml	投与順4	
6	中心静脈注射	アビタックス注射用 生理食塩液 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間 1時間 投与経路:CVルートメイン	250mg/m ² 250ml		投与順3 側管
7	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 イリノテカンと同時に 投与経路:CVルートメイン側管	200mg/m ² 250ml	投与順5	
8	中心静脈注射	イリノテカン点滴静注 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 レボホリナートと同時に 投与経路:CVルートメイン	150mg/m ² 250ml	投与順6	
9	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン	400mg/m ² 50ml	投与順7	
10	中心静脈注射	5-FU注 生理食塩液 中心静脈注射: * 点滴時間46時間 投与経路:CVルートメイン	2400mg/m ² 適宜	投与順8	
11	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間 1時間 投与経路:CVルートメイン	100ml		投与順4 側管

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg