

【大腸癌】

レジメン名称 : IRIS

インターバル日数 : 28 日

催吐リスク : 中等度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	125mg/m ²		day1.15	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン側管	4A 1V 1P	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間90分 投与経路末梢ルートメイン側管	125mg/m ² 500ml	投与順4	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2、16	day3、17	day4、18
1	内服	デカドロン	4mg		4mg	4mg	4mg
2	内服	ティーエスワン	80mg/m ²	day1~day14			