

【大腸癌】

レジメン名称: XELIRI+アバスチン

インターバル日数: 21日

基準日: day1

催吐性リスク: 中程度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	アバスチン点滴静注用	7.5mg/kg	-	day1	-	非炎症性
4	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	200mg/m ²	-	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 1P	投与順2
3	点滴静注	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン	7.5mg/kg 100ml	投与順3
4	点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン	200mg/m ² 500ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	4mg	-	4mg	4mg	4mg
2	内服	ゼローダ	1600mg/m ²	day1夕~day15朝			