

【頭頸部癌】

レジメン名称 : CDDP+RT
 催吐リスク : 高度

インターバル日数 : 7 日
 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	シスプラチン点滴静注	40mg/m ²		day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順3
4	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 80mg以上は計500mlになるように調製 点滴静注 ※点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	40mg/m ² 500ml	投与順4
5	点滴静注	ソルアセトD 500ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg