

【頭頸部癌】

レジメン名称:mTPF

インターバル日数: 28 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	ドセタキセル点滴静注	60mg/m ²		day1	-	壊死性
8	点滴静注	シスプラチン点滴静注	60mg/m ²		day1	-	炎症性
11	点滴静注	5-FU	600mg/m ²		day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day 1	day2	day3	day4
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1			
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	1V 1V 6A 100ml	投与順2			
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順1	投与順1	投与順1
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3			
5	点滴静注	ドセタキセル点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m ² 250ml	投与順4			
6	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデム1 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1A 0.4A 500ml	投与順5			
7	点滴静注	20%マンニトール300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	200ml	投与順6			
8	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン	60mg/m ² 計500ml	投与順7			
9	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 1A	投与順8			
10	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順9			
11	点滴静注	生理食塩液 500ml 5-FU 点滴静注: * 点滴時間24時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml 600mg/m ²	投与順10			
12	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間12時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順2	投与順2	投与順2
13	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴時間12時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml			投与順3	