

【耳鼻科 頭頸部癌】

レジメン名称:PCE80(75歳以上)(1コース目)

インターバル日数:21日

基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	アービタックス注射用	初回400mg/m ²	-	day1	-	非炎症性
6			2回目以降250mg/m ²		day8、15		
11	点滴静注	パクリタキセル注	80mg/m ²	-	day1、8	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
12	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	AUC1.5	-	day1、8		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 1A 100ml	投与順2	投与順2	
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 100ml			投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順3	投与順3	投与順3
5	点滴静注	アービタックス注射用 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	400mg/m ² 500ml	投与順4		
6	点滴静注	アービタックス注射用 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	250mg/m ² 250ml		投与順4	投与順4
7	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順5	投与順5	
8	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml			投与順5
9	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P	投与順6	投与順6	
10	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7	投与順7	
11	点滴静注	パクリタキセル注 大塚糖液5% 250ml 75歳以上は80mg/m ² に減量 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	80mg/m ² 250ml	投与順8	投与順8	
12	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC1.5 250ml	投与順9	投与順9	
13	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順10	投与順10	