

【頭頸部癌】

レジメン名称: アービタックス+PF(初回)  
 催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 21日 基準日: day 1

★登録はインターバル7日

★day8、15のアービタックスはアービタックス単独レジメンを使用

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称        | 標準値   | 上限値 | 投与        | ルート | 組織侵襲性 |
|----|------|-------------|---|-----|-----------|-----|-------|
| 5  | 点滴静注 | アービタックス点滴静注 | 初回400mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降250mg/m <sup>2</sup> |     | day1、8、15 | -   | 非炎症性  |
| 9  | 点滴静注 | シスプラチン点滴静注  | 80mg/m <sup>2</sup>                                 |     | day1      | -   | 炎症性   |
| 11 | 点滴静注 | 5-FU        | 800mg/m <sup>2</sup>                                |     | day1~4    | -   | 炎症性   |

| Rp | 手技   | 薬剤名称  | 用量/単位                         | day1  | day2 | day3 | day4 | day5 |
|----|------|---|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン   | 100ml                         | 投与順1  |      |      |      |      |
| 2  | 点滴静注 | アロカリス点滴静注235mg/10ml<br>パロノセトロン静注0.75mg/5ml<br>デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>ポララミン注5mg<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン | 1V<br>1V<br>6A<br>1A<br>100ml | 投与順2  |      |      |      |      |
| 3  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン  | 50ml                          | 投与順3  |      |      |      |      |
| 4  | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管  | 4A<br>100ml                   |       | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 |      |
| 5  | 点滴静注 | アービタックス点滴静注<br>生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間120分<br>投与経路:末梢ルートメイン  | 400mg/m <sup>2</sup><br>500ml | 投与順4  |      |      |      |      |
| 6  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン  | 50ml                          | 投与順5  |      |      |      |      |
| 7  | 点滴静注 | アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml<br>硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml<br>ソルデム1 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン                                   | 1A<br>0.4A<br>500ml           | 投与順6  |      |      |      |      |
| 8  | 点滴静注 | 20%マンニトール300ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン   | 200ml                         | 投与順7  |      |      |      |      |
| 9  | 点滴静注 | シスプラチン点滴静注<br>生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間120分<br>投与経路:末梢ルートメイン   | 80mg/m <sup>2</sup><br>計500ml | 投与順8  |      |      |      |      |
| 10 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml<br>アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン  | 500ml<br>1A                   | 投与順9  |      |      |      |      |
| 11 | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml<br>5-FU<br>点滴静注:<br>* 点滴時間24時間<br>投与経路:末梢ルートメイン   | 500ml<br>800mg/m <sup>2</sup> | 投与順10 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順2 |      |
| 12 | 点滴静注 | ソルアセトF 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管   | 500ml                         | 投与順11 | 投与順2 | 投与順2 |      |      |
| 13 | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン  | 50ml                          |       |      |      |      | 投与順1 |