

## 【耳鼻科 頭頸部癌】

レジメン名称:PCE100(75歳未満)(2コース目以降)

インターバル日数:21日

基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	アービタックス注射用	2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	-	day1、8、15	-	非炎症性
10	点滴静注	パクリタキセル注	100mg/m <sup>2</sup>	-	day1、8	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
11	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	AUC2	-	day1、8		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 1A 100ml	投与順2	投与順2	
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 100ml			投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順3	投与順3	投与順3
5	点滴静注	アービタックス注射用 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	250mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順4	投与順4	投与順4
6	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順5	投与順5	
7	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml			投与順5
8	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P	投与順6	投与順6	
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7	投与順7	
10	点滴静注	パクリタキセル注 大塚糖液5% 250ml 75歳以上は80mg/m <sup>2</sup> に減量 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m <sup>2</sup> 250ml	投与順8	投与順8	
11	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC2 250ml	投与順9	投与順9	
12	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順10	投与順10	