

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: イミフィンジ+イジユド+カルボプラチン+アブラキサン(6コース)

インターバル日数: 28日間 基準日: day1

催吐性リスク: 最小度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	イジユド点滴静注	75mg/body	—	day1	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	—	day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	イジユド点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	75mg/body 100ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3
4	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100ml 体重30kg以下の場合はイミフィンジ 20mg/kgに変更 * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1500mg/body 100ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5