

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: イミフィンジ+イジユド+カルボプラチン+アブラキサン(1~4コース)

催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	イジユド点滴静注	75mg/body	—	day1	フィルター付き	非炎症性
4	点滴静注	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	—	day1	フィルター付き	非炎症性
9	点滴静注	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²		day1.8.15	フィルター禁止	壊死性
11	点滴静注	カルボプラチン点滴静注液	AUC5~6	900mg	day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	イジユド点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	75mg/body 100ml	投与順2		
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3		
4	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100ml 体重30kg以下の場合はイミフィンジ20mg/kgに変更 * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン	1500mg/body 100ml	投与順4		
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順5		
6	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 3A 1P	投与順6		
7	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順2	投与順2
8	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7	投与順3	投与順3
9	点滴静注	アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m ² 50ml	投与順8	投与順4	投与順4
10	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順9	投与順5	投与順5
11	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml AUCは5~6 登録はAUC5 必要時変更してください 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC5 250ml	投与順10		
12	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順11		

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg