

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ライブリハント+ベメトレキセド+カルボプラチン(80kg未満)【3,4コース目】

催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21 日

基準日: day 1

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称         | 標準値                  | 上限値   | 投与   | ルート     | 組織侵襲性 |
|----|------|--------------|----------------------|-------|------|---------|-------|
| 4  | 点滴静注 | ベメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup> |       | day1 | ー       | 非炎症性  |
| 5  | 点滴静注 | カルボプラチン点滴静注  | AUC5                 | 750mg | day1 | ー       | 炎症性   |
| 7  | 点滴静注 | ライブリハント点滴静注  | 1750mg/body          |       | day1 | フィルター付き | 非炎症性  |

| Rp | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                          | 用量/単位                          | day1 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン                                                                 | 100ml                          | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | アロカリス点滴静注235mg/100ml<br>グラニセトロン点滴静注3mg/100ml<br>デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>ボラミン注5mg/1ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管 | 1V<br>1P<br>3A<br>1A           | 投与順2 |
| 3  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                            | 50ml                           | 投与順3 |
| 4  | 点滴静注 | ベメトレキセド点滴静注<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間10分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                           | 500mg/m <sup>2</sup><br>計100ml | 投与順4 |
| 5  | 点滴静注 | カルボプラチン点滴静注<br>大塚糖液5% 250ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                          | AUC5<br>250ml                  | 投与順5 |
| 6  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                            | 50ml                           | 投与順6 |
| 7  | 点滴静注 | ライブリハント点滴静注<br>生理食塩液 250ml<br>点滴静注:<br>* 125ml/hrで投与<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                       | 1750mg/body<br>計250ml          | 投与順7 |
| 8  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                            | 50ml                           | 投与順8 |

| Rp | 手技   | 薬剤名称            | 用量/単位       | day1                             | day2 | day3 |
|----|------|-----------------|-------------|----------------------------------|------|------|
| 1  | 内服   | アセトアミノフェン錠500mg | 1000mg      | 1000mg                           |      |      |
| 2  | 内服   | デカドロン錠          | 4mg         |                                  | 4mg  | 4mg  |
| 3  | 内服   | バンピタン末          | 1g(葉酸0.5mg) | 初回投与の7日前から連日投与                   |      |      |
| 4  | 筋肉注射 | メチコパール注射液500μg  | 1000μg(2A)  | 初回投与の7日前に投与、その後9週ごと(3コースごと)に1回投与 |      |      |