

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ライブリバント+ペメトレキセド維持 (80kg未満)

インターバル日数: 21 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²		day1	-	非炎症性
6	点滴静注	ライブリバント点滴静注	1750mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポラミン注5mg/1ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 100ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3
4	点滴静注	ペメトレキセド点滴静注 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間10分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500mg/m ² 計100ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5
6	点滴静注	ライブリバント点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 125ml/hrで投与 投与経路:末梢ルートメイン側管	1750mg/body 計250ml	投与順6
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	アセトアミノフェン錠500mg	1000mg	1000mg
2	内服	バンピタン末	1g(葉酸0.5mg)	初回投与の7日前から連日投与
3	筋肉注射	メチコパール注射液500μg	1000μg(2A)	初回投与の7日前に投与、その後9週ごと(3コースごと)に1回投与