

【小細胞肺癌】

レジメン名称 : イムデトラ【1コース目】

催吐リスク : 最小度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	イムデトラ点滴静注用	1mg/body	－	day1	－	非炎症性
5	点滴静注	イムデトラ点滴静注用	10mg/body	－	day8.15	－	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml	投与順2	投与順2	
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3	投与順2
4	点滴静注	イムデトラ点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 注射用水1.3mlで溶解、1.1ml採取 輸液安定化剤13mLを混注 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1mg/body 必要量 計250ml	投与順4		
5	点滴静注	イムデトラ点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 注射用水4.4mlで溶解、4.2ml採取 輸液安定化剤13mLを混注 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	10mg/body 必要量 計250ml		投与順4	投与順3
6	点滴静注	生理食塩液 1000ml 点滴静注: * 点滴時間4時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000ml	投与順5	投与順5	投与順4