

【乳癌】

レジメン名称:ダトロウエイ

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	ダトロウエイ点滴静注用	6mg/kg	—	day1	フィルター付き	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg/1ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	1V 6A 1A 100ml	投与順2
3	中心静脈注射	5%糖液 100ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	ダトロウエイ点滴静注用 注射用水20ml 5%糖液 100ml 遮光 100mg/Vを5mlの注射用水で溶解(20mg/ml) * 点滴時間初回90分、2回目以降30分 投与経路:CVルートメイン側管	6mg/kg 必要量 100ml	投与順4
5	中心静脈注射	5%糖液 100ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	アセトアミノフェン錠	500mg	500mg