

【乳癌】

レジメン名称: フェスゴ+パクリタキセル(2回目以降)

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
1	皮下注射	フェスゴ配合皮下注MA	ヘルツスマブ [®] 600mg + トラスツスマブ [®] 600mg/10ml	—	day1	—	非炎症性
5	中心静脈注射	パクリタキセル注	80mg/m ²	—	day1、8、15	PVCフリー/フィルター付き	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	皮下注射	フェスゴ配合皮下注MA 翼状針使用のため全量採取 5分以上かけて大腿部に皮下投与 皮下投与	10ml	投与順1		
2	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順2	投与順1	投与順1
3	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	4A 1A 1A 100ml	投与順3	投与順2	投与順2
4	中心静脈注射	生理食塩液 100ml * 点滴時間 30分 投与経路:CVルートメイン側管	100ml	投与順4	投与順3	投与順3
5	中心静脈注射	パクリタキセル注 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間1時間 投与経路:CVルートメイン側管	80mg/m ² 250ml	投与順5	投与順4	投与順4
6	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順5	投与順5