

【乳癌】

レジメン名称:トロデルビ

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	—	day1、8	—	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポラミン注5mg/1ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	1V 6A 1A 1A 100ml	投与順2	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3
4	中心静脈注射	トロデルビ点滴静注用 生理食塩液 250ml 遮光 200mg/Vを生食20mlで溶解(10mg/ml) 初回3時間、2回目以降1時間で投与 1.1～3.4mg/mlになるように輸液量を適宜調節 <270mg: 100ml 270～800mg: 250ml >800mg: 500ml * 点滴時間3時間 投与経路:CVルートメイン側管	10mg/kg 250ml	投与順4	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順5