

【悪性黒色腫】

レジメン名称 : DAVFeron

インターバル日数 : 28 日

嘔吐性リスク : 高度

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	標準値
4	点滴静注	ダカルバジン注	140mg/m ²		day1-5		炎症性	80~140mg/m ²
5	点滴静注	ニドラン注	80mg/m ²		day1		壊死性	50~80mg/m ²
6	点滴静注	オンコビン注	0.8mg/m ²	2mg	day1		壊死性	0.5~0.8mg/m ²

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン	500ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2				
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
4	点滴静注	ダカルバジン注 生理食塩液 50ml 遮光 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	140mg/m ² 50ml	投与順4	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
5	点滴静注	ニドラン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	80mg/m ² 50ml	投与順5				
6	点滴静注	オンコビン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	0.8mg/m ² 50ml	投与順6				
7	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg		8mg	8mg	8mg
2	皮内注射	フェロン300万単位	300万単位	day1-10			