

【胸腺腫瘍】

レジメン名称: ADOC療法

インターバル日数: 28日

基準日: day 1

催吐性リスク: 高度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
5	点滴静注	ドキシソルビシン塩酸塩注射液	40mg/m ²	500mg/m ²	day1		壊死性
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注	50mg/m ²		day1		炎症性
6	点滴静注	オンコピン注射用	0.6mg/m ²	2mg/body	day3		壊死性
7	点滴静注	注射用エンドキサン	700mg/m ²		day4		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1		投与順1	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2			
3	点滴静注	デキササート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順1 メイン	投与順2	投与順2
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3			
5	点滴静注	ドキシソルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	40mg/m ² 50ml	投与順4			
6	点滴静注	オンコピン注射用 生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	0.6mg/m ² 50ml			投与順3	
7	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	700mg/m ² 500ml				投与順3
8	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml	投与順5			
9	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順6			
10	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順7			
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50mg/m ² 計500ml	投与順8			
12	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml 1A	投与順9			
13	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順10			
14	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml		投与順2 メイン	投与順4	投与順4
15	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml		投与順3 メイン	投与順5	投与順5
16	点滴静注	生理食塩液 20ml 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン(ロック用)	20ml	投与順11	投与順4	投与順6	