

【泌尿器 尿路上皮癌】
インターバル日数:14日 基準日:day1

レジメン名称:dd MVAC 催吐性リスク:高度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
2	点滴静注	注射用メソトレキセート	30mg/㎡	—	day1	—	非壊死性	
7	点滴静注	エクザール注射用	3mg/m ²	—	day2	—	壊死性	
8	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液	30mg/㎡	—	day2	—	壊死性	500mg/㎡
11	点滴静注	シスプラチン点滴静注	70mg/㎡	—	day2	—	炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1			
2	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン 側管	500ml	投与順2				
3	点滴静注	注射用メソトレキセート 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	30mg/㎡ 100ml	投与順3				
4	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順4				
5	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml		投与順2			
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml		投与順3			
7	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	4A 100ml			投与順1	投与順1	投与順1
8	点滴静注	エクザール注射用 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	3mg/m ² 50ml		投与順4			
9	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	30mg/㎡ 50ml		投与順5			
10	点滴静注	アスバラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 20ml ソルデムI 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml		投与順6			
11	点滴静注	マンニゲン注20% 200ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml		投与順7			
12	点滴静注	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: ※点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	70mg/m ² 計500ml		投与順8			
13	点滴静注	生理食塩液 500ml アスバラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml 1A		投与順9			
14	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml		投与順10	投与順2	投与順2	
14	点滴静注	ソリアセトF 500ml 点滴静注: ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml		投与順11	投与順3 メイン	投与順3 メイン	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	皮下注射	ジークラスタ皮下注3.6mg	3.6mg				3.6mg皮下	