

【小細胞肺癌】

レジメン名称:カルボプラチン+エトポシド+テセントリク

インターバル日数:21 日

基準日:day 1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	テセントリク点滴静注	1200mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
7	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC5	750mg	day1		炎症性
8	点滴静注	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²		day1.2.3	PVCフリー	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	テセントリク点滴静注 生理食塩液 250ml * 点滴時間 初回60分、2回目以降30分 投与経路:末梢ルートメイン	1200mg/body 250ml	投与順2	-	-
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3	-	-
4	点滴静注	アロカリス点滴静注用235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 3A	投与順4	-	-
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	-	-
6	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	2A 100ml	-	投与順2	投与順2
7	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC5 250ml	投与順6	-	-
8	点滴静注	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100mg/m ² 500ml	投与順7	投与順3	投与順3
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順8	投与順4	投与順4