

【血液内科 悪性リンパ腫】

レジメン名称 : A+CHP

インターバル日数 : 21 日

吐性リスク : 高度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称           | 標準値                  | 上限値   | 投与   | ルート | 組織侵襲性 | 総投与量                 |
|----|------|----------------|----------------------|-------|------|-----|-------|----------------------|
| 3  | 点滴静注 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液 | 50mg/m <sup>2</sup>  |       | day1 | -   | 壊死性   | 500mg/m <sup>2</sup> |
| 4  | 点滴静注 | 注射用エンドキサン      | 750mg/m <sup>2</sup> |       | day1 | -   | 炎症性   |                      |
| 8  | 点滴静注 | アドセトリス点滴静注用    | 1.8mg/kg             | 180mg | day1 | -   | 非炎症性  |                      |

| Rp | 手技   | 薬剤名称  | 用量/単位                         | day1 |
|----|------|---|-------------------------------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>点滴静注<br>※点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン   | 100ml                         | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml<br>点滴静注<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管   | 100ml                         | 投与順2 |
| 3  | 点滴静注 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液<br>生理食塩液 50ml<br>点滴静注<br>※点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管  | 50mg/m <sup>2</sup><br>50ml   | 投与順3 |
| 4  | 点滴静注 | 注射用エンドキサン<br>生理食塩液 500ml<br>点滴静注<br>※点滴時間2時間<br>投与経路:末梢ルートメイン側管   | 750mg/m <sup>2</sup><br>500ml | 投与順4 |
| 5  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注<br>※点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管  | 50ml                          | 投与順5 |
| 6  | 静注   | ボラミン注5mg<br>ワンショットで<br>静注<br>投与経路:末梢ルートメイン側管  | 1A                            | 投与順6 |
| 7  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注<br>※点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管  | 50ml                          | 投与順7 |
| 8  | 点滴静注 | アドセトリス点滴静注用<br>注射用水100ml<br>生理食塩液 100ml<br>1Vあたり注射用水10.5mlで溶解(5mg/ml)<br>158mg以上は生食250mlに変更(0.4~1.2mg/ml)<br>点滴静注<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管 | 1.8mg/kg<br>必要量<br>100ml      | 投与順8 |
| 9  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注<br>* 点滴時間5分<br>側管投与経路:末梢ルートメイン側管   | 50ml                          | 投与順9 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称       | 用量/単位      | day1  | day2 | day3   | day4       | day5 |
|----|----|------------|------------|-------|------|--------|------------|------|
| 1  | 内服 | プレドニゾン錠5mg | 100mg/body |       |      | day1~5 | 100mg/body |      |
| 2  | 内服 | イメドカプセル    | 125mg、80mg | 125mg | 80mg | 80mg   |            |      |

★ 158mg以上(約88kg以上)では生食250mlに変更

★ 体重100kgを超える場合は100kgとして計算する