

【ホジキンリンパ腫】

レジメン名称 : ABVD

催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液	25mg/m ²		day1、15		壊死性	500mg/m ²
4	点滴静注	プレオ注射用	10mg/m ²	15mg	day1、15		非炎症性	300mg
5	点滴静注	エクザール注射用	6mg/m ²	10mg	day1、15		壊死性	
6	点滴静注	ダカルバジン注用	375mg/m ²		day1、15		炎症性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day15
1	点滴静注	生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液1.65mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	1V 6A 100ml	投与順2	投与順2
3	点滴静注	ドキソルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	25mg/m ² 50ml	投与順3	投与順3
4	点滴静注	プレオ注射用 生理食塩液50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	10mg/m ² 50ml	投与順4	投与順4
5	点滴静注	エクザール注射用 生理食塩液50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	6mg/m ² 50ml	投与順5	投与順5
6	点滴静注	ダカルバジン注用 5%糖液100ml 遮光 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	375mg/m ² 100ml	投与順6	投与順6
7	点滴静注	生理食塩液50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50ml	投与順7	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1、15	day2、16	day3、17
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	内服	デカドロン錠	8mg	day2～4、day16～18		