

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : CHOP

催吐性リスク : 高度

インターバル日数 :

21 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ドキシルビシン塩酸塩注射液	50mg/m ²		day1	-	壊死性	500mg/m ²
5	点滴静注	注射用エンドキサン	750mg/m ²		day1	-	炎症性	
4	点滴静注	オンコビン注	1.4mg/m ²	2mg	day1	-	壊死性	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路: ルートキープ用	100ml	投与順1
2	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順2
3	点滴静注	ドキシルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50mg/m ² 50ml	投与順3
4	点滴静注	オンコビン注 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	1.4mg/m ² 50ml	投与順4
5	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路: 末梢ルートメイン	750mg/m ² 500ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	内服	ブレドニゾロン錠5mg	60mg/m ²	day1～5		