

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : Pola+R-CHP2日

インターバル日数 :

21 日

催吐性リスク : 高度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	-	day2		非炎症性	-
7	点滴静注	ボライビー点滴静注用	1.8mg/kg	-	day1	フィルター付き	非炎症性	-
9	点滴静注	注射用エンドキサン	750mg/m ²	-	day1	-	炎症性	
10	点滴静注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50mg/m ²	-	day1	-	壊死性	500mg/m ²

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2
1	点滴静注	生理食塩液100ml ボラミンを側管から投与 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順1 ルートキープ用	投与順1 ボラミン投与後30分後にリツキシマブ開始
2	静注	ボラミン注5mg/1ml ワンショットで 静注 投与経路: 末梢ルートメイン側管	1A	投与順2	投与順2
3	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路: 末梢ルートメイン	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)		投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50ml		投与順4
5	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	1V 100ml	投与順3	
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50ml	投与順4	
7	点滴静注	ボライビー点滴静注用 30mg/Vは1.8ml、140mg/Vは7.2mlで溶解 注射用水20ml 生理食塩液 100ml 0.72mg/ml～2.7mg/ml 72mg未満は生食50mlに変更 点滴静注 * 点滴時間初回90分、2回目以降30分 投与経路: 末梢ルートメイン	1.8mg/kg (20mg/ml) 必要量 100ml	投与順5	
8	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順6	
9	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路: 末梢ルートメイン	750mg/m ² 500ml	投与順7	
10	点滴静注	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50mg/m ² 50ml	投与順8	
11	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン	50ml	投与順9	

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	イメンドカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg		
2	内服	ブレドニゾロン錠5mg	100mg/body		day1～5	100mg/body		