

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : EPOCH

催吐性リスク : 高度

インターバル日数 : 21 日

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液	50mg/m ²		day1～4	PVC7リ-	炎症性	-
5	中心静脈注射	オンコビン注	0.4mg/m ²	2mg	day1～4	-	壊死性	-
5	中心静脈注射	ドキソルビシン塩酸塩注射液	10mg/m ²		day1～4	-	壊死性	500mg/m ²
6	中心静脈注射	注射用エンドキサン	750mg/m ²		day5	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	中心静脈注射	生理食塩液100ml 点滴静注 ルートキープ用 投与経路: CVルートメイン	100ml	投与順1	-	-	-	投与順2
2	中心静脈注射	パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路: CVルートメイン	1V 100ml	投与順2	-	-	-	-
3	中心静脈注射	生理食塩液50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン	50ml	投与順3	-	-	-	投与順4
4	中心静脈注射	エトボシド点滴静注液 5%糖液 500ml オンコビン、ドキソルビシンと同時に 点滴静注 ※点滴時間24時間 投与経路: CVルートメイン	50mg/m ² 500ml	投与順4	投与順1	投与順1	投与順1	-
5	中心静脈注射	生理食塩液50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン側管	50ml	投与順5				投与順1
6	中心静脈注射	オンコビン注 ドキソルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 500ml エトボシドと同時に 点滴静注 ※点滴時間24時間 投与経路: CVルート側管	0.4mg/m ² 10mg/m ² 500ml	投与順6	投与順2	投与順2	投与順2	-
7	中心静脈注射	注射用エンドキサン 生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間2時間 投与経路: CVルートメイン	750mg/m ² 500ml	-	-	-	-	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	内服	アブレヒタントカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg	-	-
2	内服	プレドニゾン錠5mg	60mg/m ² ～120mg/m ²	day1～5				