

【骨髓異形成症候群】

レジメン名称 : アザシチジン点滴

インターバル日数 : 28 日

催吐性リスク : 中等度

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	アザシチジン注射用	75mg/m ²		day1～7	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	アザシチジン注射用 注射用水 生理食塩液 50ml 100mg/V:10ml、150mg/V:15ml 点滴静注: * 点滴時間10分 投与経路:末梢ルートメイン側管	75mg/m ² 必要量 50ml 蒸留水で溶解(10mg/ml)	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
1	内服	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)

* 調製から1時間以内に投与終了