

【多発性骨髄腫】

レジメン名称 : IsaVRd (BENEFIT) 【19サイクル以降】 インターバル日数 : 28 日
 催吐性リスク : 軽度 基準日 day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	サークリサ点滴静注	10mg/kg	-	day1	フィルター付き	非炎症性
2	内服	レブラミドカプセル	25mg/body	-	day1～21	-	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	ボラミン注5mg ファモチジン静注20mg 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 1A 50ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3
4	点滴静注	サークリサ点滴静注 生理食塩液 250ml 計250mlになるように調製 投与経路:末梢ルートメイン側管	10mg/kg 計250ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	アセトアミノフェン錠500mg	1000mg	1000mg
2	内服	レブラミドカプセル	25mg	day1～21

- ★ アセトアミノフェンはサークリサの投与1時間～15分前に投与
- ★ 輸血時の間接クームス試験に影響あり
- ★ サークリサ投与速度

＜初回＞ 25ml/h 1時間
 50ml/h 30分
 75ml/h 30分
 100ml/h 30分
 125ml/h 30分
 以後150ml/h

＜2回目＞ 50ml/h 30分
 100ml/h 30分
 以後200ml/h

＜3回目以降＞ 200ml/h