

【急性骨髄性白血病】

レジメン名称 : アザシチジン+ベネクレクタ インターバル日数 : 28 日
 催吐性リスク : 中等度 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
1	皮下注	アザシチジン注射用	75mg/m ²		day1～7	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
1	皮下注	アザシチジン注射用 注射用水 100mg/V:4ml、150mg/V:6ml 蒸留水で溶解(25mg/ml) 皮下投与	75mg/m ²	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7
1	内服	ナゼアOD錠0.1mg		0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)	0.1mg(1錠)
2	内服	ベネクレクタ錠		100mg	200mg	day3～400mg				

* 調製から1時間以内に投与終了
 4mlを超える場合は2本の注射筒に2等分し2カ所に注射