

【急性前骨髄球性白血病】

レジメン名称 : トリセノックス地固め

催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 35日

基準日 : day1

★5週間で計25回投与

★登録は5日間、インターバル2日

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	トリセノックス点滴静注	0.15mg/kg	-	day1～5	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢メインルート	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢メインルート側管	50ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	トリセノックス点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注 * 点滴時間2時間 投与経路:末梢メインルート側管	0.15mg/kg 250ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路:末梢メインルート側管	50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4