

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ライブリバント+ラズクルーズ(80kg以上)【2コース目以降】

インターバル日数: 14 日

基準日: day 1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ライブリバント点滴静注	1400mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボララミン注5mg/1ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 100ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3
4	点滴静注	ライブリバント点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 125ml/hrで投与 投与経路:末梢ルートメイン側管	1400mg/body 計250ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	内服	アセトアミノフェン錠500mg	1000mg	1000mg
2	内服	ラズクルーズ錠	240mg	1日1回連日投与

★治療開始後4か月間、アピキサバン1回2.5mg1日2回経口投与

★アセトアミノフェンはライブリバントの投与30～60分前に服用